



tradecorp® AZ plus

CJELOVITA MJEŠAVINA MIKROELEMENATA U HELATNOM I VODOTOPIVOM OBLIKU
PRAVO RIJEŠENJE ZA SVE POLJOPRIVREDNE KULTURE


Helatni oblik: EDTA

Formulacija: Vodotopive mikrogranule (WG)

Interval stabilnosti helata: pH 3,0-10,0

PAKIRANJA GNOJIVA

KUTIJE



VREĆE



EZ GNOJIVO

TEHNIČKE KARATKERISTIKE GNOJIVA

Željezo (Fe) helat EDTA topiv u vodi: 6,0% m/m

Mangan (Mn) helat EDTA topiv u vodi: 2,5% m/m

Cink (Zn) helat EDTA topiv u vodi: 1,2 % m/m

Bakar (Cu) helat EDTA topiv u vodi: 0,6% m/m

Kobalt (Co) helat EDTA topiv u vodi: 0,02% m/m

Bor (B) vodotopivi: 0,5% m/m

Molibden (Mo) vodotopivi: 0,4% m/m

PREDNOSTI PRIMJENE GNOJIVA TRADECORP AZ Plus

- Kompletno gnojivo na bazi svih fiziološki važnih mikroelemenata za sve poljoprivredne kulture
- Potiče sve fiziološke procese u biljci (fotosinteza, diferencijacija cvjetnih pupova, cvatnja, oplodnja, rast plodova, rast listova i izboja)
- Može se koristiti u svim tehnologijama gnojidbe; folijarna gnojidba, gnojdiba u tlo, hidroponska proizvodnja
- Gnojivo brze i potpune topivosti u vodi
- Dobar učinak u gnojidbi svih mahunarki (soja, grah, grašak) zbog sadržaja kobalta (Co) koji potiče formiranje i rad krvžićnih bakterija (fiksacije dušika)

DOZA I NAČIN PRIMJENE GNOJIVA

HIDROPONSKI UZGOJ

Sve kulture	0,3-0,5 kg/1000 L matične otopine.	Pripremiti matičnu otopinu prema navedenoj koncentraciji i primjeniti 1 lit. koncentrirane otopine na svaki 100 lit. vode u jednom ciklusu navodnjavanja/prihrane. Primjeniti u fazama intenzivnog rasta kultura u hidroponskom uzgoju.
-------------	------------------------------------	--

FERTIRIGACIJA

Sve kulture	2-4 kg/ha	Svakih 4 tjedna tijekom uzgojnog ciklusa kulture
-------------	-----------	--

FOLIJARNA GNOJDIBA

Sve kulture	1,0-1,5 kg/ha	Dozu primjene prilagoditi stanju i potrebi kulture za mikroelementima
Drvenaste kulture, vinova loza, maslina	1,0 kg/ha	Primjeniti 2-3x od početka vegetacije do cvatnje, te 1x nakon cvatnje
Ratarske kulture i industrijsko bilje	1,0 kg/ha	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta kulture (dovoljne lisne mase) i prije cvatnje kod mahunarki (soje)
Povrće	0,5-1,0 kg/ha	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta kulture ili kod nedostatka bakra
Krumpir i gomoljasto povrće	1,0 kg/ha	Primjeniti 4x tretmana tijekom vegetativnog rasta kulture. Koristiti min. 500 lit. vode/ha
Ukrasno bilje i cvijeće	75-100 g/100 lit. vode	Primjeniti u vrijeme početka vegetativnog rasta kulture
Pašnjaci i travnjaci	1,0-2,0 kg/ha	Primjeniti nakon svakog ciklusa košnje travnjaka