

## 01 Mikroelementi

### 1.3. Cink (Zn)



# tradecorp® Zn

CINK (Zn) U OBLIKU Zn-EDTA HELATA. VODOTOPIVE MIKROGRANULE (WG)  
UČINKOVITA GNOJIDBA CINKOM (Zn) ZA SVE POLJOPRIVREDNE KULTURE

Helatni oblik: EDTA

Formulacija: Vodotopive mikrogranule (WG)

Interval stabilnosti helata: pH 4,0-9,0

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GNOJIVA

Cink (Zn) helat EDTA topiv u vodi: 14,0% m/m

#### PAKIRANJA GNOJIVA

##### KUTIJE



##### VREĆE



#### EZ GNOJIVO



Primjena u ekološkoj  
Poljoprivredi.  
Gnojivo sukladno sa  
EZ normom  
834/2007 i 889/2008

#### PREDNOSTI PRIMJENE GNOJIVA TRADECORP Zn

- Maksimalni učinak u gnojidbi cinkom (Zn) i kod primjene niske doze gnojiva, u svim načinima primjene gnojiva (fertiligacija, hidroponski uzgoj, gnojidba u tlo, folijarna gnojidba)
- Brza i potpuna vodotopivost bez stvaranja taloga i grudica
- Dobra kompatibilnost sa ostalim gnojivima, biostimulatorima i pesticidima kod folijarne gnojidbe
- Preporuka za primjenu u svim uvjetima nedostatka cinka i kod kultura koje imaju visoke potrebe za manganom (krumpir, kukuruz)

#### Preporuka za primjenu u ekološkoj poljoprivredi

#### DOZA I NAČIN PRIMJENE GNOJIVA

##### FERTIRIGACIJA

Sve kulture	2-4 kg/ha	Svaki 4 tjedna tijekom uzgojnog ciklusa kulture
-------------	-----------	---

##### HIDROPONSKI UZGOJ

Sve kulture	0,3-0,5 kg/1000 L matične otopine.	Pripremiti matičnu otopinu prema navedenoj koncentraciji i primjeniti 1 lit. koncentrirane otopine na svaki 100 lit. vode u jednom ciklusu navodnjavanja/prihrane. Primjeniti u fazama intenzivnog rasta kultura u hidroponskom uzgoju.
-------------	------------------------------------	---

##### FOLIJARNA GNOJDIBA

Sve kulture	0,5-1,5 kg/ha	Dozu primjene prilagoditi stanju i potrebi kulture za cinkom
Drvenaste kulture, vinova loza, maslina	0,5-1,5 kg/ha	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta i nakon cvatnje
Ratarske kulture i industrijsko bilje	1,0-1,5 kg/ha	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta kulture (dovoljne lisne mase)
Povrće	1,0 kg/ha	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta kulture ili kod nedostatka cinka
Ukrasno bilje i cvijeće	100-150 g/100 lit. vode	Primjeniti u vrijeme vegetativnog rasta kulture